







Modèle bayésien hiérarchique pour l'estimation du coefficient de reproduction de la COVID-19 à partir de comptes hebdomadaires


**GRETSI'25** : XXX<sup>ème</sup> Colloque français de Traitement du Signal et des Images Strasbourg, 25 au 29 août 2025

Barbara Pascal† et Patrice Abry ‡

† Nantes Université, École Centrale Nantes, CNRS, LS2N, UMR 6004, F-44000 Nantes, France

<sup>‡</sup> CNRS, Ens de Lyon, Laboratoire de Physique, Lyon, France

Avec le soutien du financement ANR OptiMoCSI (ANR-23-CE48-0009)



Suivi de la COVID-19 par l'Université Johns Hopkins (coronavirus.jhu.edu)



Suivi de la COVID-19 par l'Université Johns Hopkins (coronavirus.jhu.edu)

**Nombre de reproduction effectif :** indicateur épidémiologique R<sub>t</sub> dépendant du temps nombre de cas secondaires générés par un individu contagieux

(Wallinga et coll. 2004, Am. J. of Epidemiol.; Cori et coll. 2013, Am. J. Epidemiol.)



Suivi de la COVID-19 par l'Université Johns Hopkins (coronavirus.jhu.edu)

**Nombre de reproduction effectif :** indicateur épidémiologique R<sub>t</sub> dépendant du temps nombre de cas secondaires générés par un individu contagieux

(Wallinga et coll. 2004, Am. J. of Epidemiol.; Cori et coll. 2013, Am. J. Epidemiol.)

#### Interprétation directe

- $R_t < 1$  décroissance exponentielle du nombre de cas
- $R_t = 1$  épidémie stable
- $R_t > 1$  croissance exponentielle du nombre de cas : vague épidémique

Objectif : estimation de R<sub>t</sub> précise, robuste avec niveau de confiance fiable



Suivi de la COVID-19 par l'Université Johns Hopkins (coronavirus.jhu.edu)

Nombre de reproduction effectif : indicateur épidémiologique  $R_t$  dépendant du temps nombre de cas secondaires générés par un individu contagieux

(Wallinga et coll. 2004, Am. J. of Epidemiol.; Cori et coll. 2013, Am. J. Epidemiol.)

#### Enjeux et difficultés de l'estimation durant une pandémie :


- forte variabilité intrinsèque des comptes due à la propagation virale aléatoire
- erreurs et délais dans le report des cas, par exemple lors des jours chômés
- passage d'un report quotidien à un décompte à l'échelle de la semaine

## État-de-l'art en épidémiologie : EpiEstim

### Estimation en deux étapes :

• comptes quotidiens par interpolation  $\widehat{Z}_t^{jour} \text{ à partir des } Z_w^{semaine}$  guidée par modèle de propagation

(Nash et coll. 2023, PLoS Comput. Biol.)



### État-de-l'art en épidémiologie : EpiEstim


#### Estimation en deux étapes :

• comptes quotidiens par interpolation

$$\widehat{Z}_t^{jour}$$
 à partir des  $Z_w^{semaine}$  guidée par modèle de propagation (Nash et coll. 2023, *PLoS Comput. Biol.*)

• estimateur bayésien régularisé

```
\widehat{\mathbf{R}}^{\mathsf{EpiEstim}} \quad : \mathsf{moyenne} \ \mathsf{\grave{a}} \ \mathsf{posteriori} \widehat{\mathbf{IC}}^{\mathsf{EpiEstim}} \quad : \mathsf{intervalles} \ \mathsf{de} \ \mathsf{cr\acute{e}dibilit\acute{e}} \mathsf{quantiles} \ \mathsf{\grave{a}} \ \varepsilon = 2,5\% \ \mathsf{et} \ 1 - \varepsilon = 97,5\% (\mathsf{Cori} \ \mathsf{et} \ \mathsf{coll}. \ 2013, \ \mathit{Am. J. Epidemiol.}; \ \mathsf{Thompson} \ \mathsf{et} \ \mathsf{coll}. \ 2019, \ \mathit{Epidemics})
```



## État-de-l'art en épidémiologie : EpiEstim

#### Estimation en deux étapes :


comptes quotidiens par interpolation

$$\widehat{Z}_t^{jour}$$
 à partir des  $Z_w^{semaine}$  guidée par modèle de propagation (Nash et coll. 2023, *PLoS Comput. Biol.*)

• estimateur bayésien régularisé

Thompson et coll. 2019. Epidemics)

$$\widehat{\mathbf{R}}^{\mathsf{EpiEstim}} : \mathsf{moyenne} \ \mathsf{a} \ \mathsf{posteriori}$$
 
$$\widehat{\mathbf{IC}}^{\mathsf{EpiEstim}} : \mathsf{intervalles} \ \mathsf{de} \ \mathsf{cr\'{e}dibilit\'{e}}$$
 quantiles 
$$\mathsf{a} \ \varepsilon = 2,5\% \ \mathsf{et} \ 1 - \varepsilon = 97,5\%$$
 (Cori et coll. 2013, *Am. J. Epidemiol.*;



#### Limitations:

- fluctuations temporelles rapides : incompatible avec évolution régulière
- intervalles de crédibilité très étroits : ne reflète pas l'incertitude réelle
- biais : estimation quotidienne à partir de données hebdomadaires

#### Distribution de Poisson

$$\mathsf{Z}_t \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t\right), \; \mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{r_{\Phi}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Cori et coll. 2013, Am. J. Epidemiol.; Liu et coll. 2018, PNAS)

#### Distribution de Poisson

$$\mathsf{Z}_t \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t\right), \; \mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{r_{\Phi}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Cori et coll. 2013, Am. J. Epidemiol.; Liu et coll. 2018, PNAS)

Estimateur du maximum de vraisemblance :  $\widehat{R}_t^{\mathrm{ML}} = Z_t/\Phi_t^{\boldsymbol{Z}}$ 


#### Distribution de Poisson

$$\mathsf{Z}_t \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t\right), \; \mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{r_{\Phi}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Cori et coll. 2013, Am. J. Epidemiol.; Liu et coll. 2018, PNAS)

Estimateur du maximum de vraisemblance :  $\widehat{R}_t^{\mathrm{ML}} = Z_t/\Phi_t^{\boldsymbol{Z}}$ 

Données synthétiques : (Cori et coll. 2013, Am. J. Epidemiol.; Liu et coll. 2018, PNAS)



 φ: distribution Gamma tronquée à τ<sub>Φ</sub> = 25 jours, moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours (Cereda et coll. 2020, arXiv:2003.09320; Riccardo et coll. 2020, Euro Surveillance)

Distribution de Poisson remise à l'échelle  $\gamma > 1$  : variance mieux ajustée

$$\frac{\mathsf{Z}_t}{\gamma} \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t}{\gamma}\right), \; \mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{\tau_{\Phi}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)

Estimateur du maximum de vraisemblance :  $\widehat{R}_t^{\mathrm{ML}} = Z_t/\Phi_t^{\boldsymbol{Z}}$ 


Distribution de Poisson remise à l'échelle  $\gamma > 1$  : variance mieux ajustée

$$\frac{\mathsf{Z}_t}{\gamma} \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\Phi_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t}{\gamma}\right), \ \Phi_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{\tau_{\Phi}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)

Estimateur du maximum de vraisemblance :  $\widehat{R}_t^{\mathrm{ML}} = Z_t/\Phi_t^{\boldsymbol{Z}}$ 

**Données synthétiques :**  $\gamma = 10$  (Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)



 φ: distribution Gamma tronquée à τ<sub>Φ</sub> = 25 jours, moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours (Cereda et coll. 2020, arXiv:2003.09320; Riccardo et coll. 2020, Euro Surveillance)


Distribution de Poisson remise à l'échelle  $\gamma > 1$  : variance mieux ajustée

$$\frac{\mathsf{Z}_t}{\gamma} \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\Phi_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t}{\gamma}\right), \ \Phi_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{\tau_{\Phi}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)

Estimateur du maximum de vraisemblance :  $\widehat{R}_t^{\mathrm{ML}} = Z_t/\Phi_t^{\boldsymbol{Z}}$ 

**Données synthétiques :**  $\gamma = 100$  (Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)



 φ: distribution Gamma tronquée à τ<sub>Φ</sub> = 25 jours, moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours (Cereda et coll. 2020, arXiv:2003.09320; Riccardo et coll. 2020, Euro Surveillance)


#### Distribution de Poisson remise à l'échelle $\gamma > 1$ : variance mieux ajustée

$$\frac{\mathsf{Z}_t}{\gamma} \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t}{\gamma}\right), \; \mathsf{\Phi}_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{\tau_{\mathsf{\Phi}}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)

Estimateur du maximum de vraisemblance :  $\widehat{R}_t^{\mathrm{ML}} = Z_t/\Phi_t^{\boldsymbol{Z}}$ 

**Données synthétiques :**  $\gamma = 1000$  (Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)



 φ: distribution Gamma tronquée à τ<sub>Φ</sub> = 25 jours, moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours (Cereda et coll. 2020, arXiv:2003.09320; Riccardo et coll. 2020, Euro Surveillance)


#### Distribution de Poisson remise à l'échelle $\gamma > 1$ : variance mieux ajustée

$$\frac{\mathsf{Z}_t}{\gamma} \mid \mathsf{Z}_1, \dots, \mathsf{Z}_{t-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\Phi_t^{\mathsf{Z}} \mathsf{R}_t}{\gamma}\right), \ \Phi_t^{\mathsf{Z}} = \sum_{s=1}^{\tau_{\Phi}} \phi(s) \mathsf{Z}_{t-s}$$

(Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)

Estimateur du maximum de vraisemblance :  $\widehat{R}_t^{\mathrm{ML}} = Z_t/\Phi_t^{\boldsymbol{Z}}$ 


**Données synthétiques :**  $\gamma = 10^4$  (Pascal et coll. 2024, arXiv:2409.14937)



φ: distribution Gamma tronquée à τ<sub>Φ</sub> = 25 jours, moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours
 (Cereda et coll. 2020, arXiv: 2003.09320; Riccardo et coll. 2020, Euro Surveillance)

### Modèle épidémiologique pour des comptes hebdomadaires


• En fin de pandémie : reports hebdomadaires au lieu de quotidiens




Suivi de la COVID-19 par l'Université Johns Hopkins (coronavirus.jhu.edu)

### Modèle épidémiologique pour des comptes hebdomadaires


• En fin de pandémie : reports hebdomadaires au lieu de quotidiens






Suivi de la COVID-19 par l'Université Johns Hopkins (coronavirus.jhu.edu)

Erreurs administratives lissées par agrégation des comptes sur une semaine






(Ferguson et coll. 2016, Science; Charniga et coll. 2021, PLoS Comput. Biol.)

### Modèle de Poisson remis à l'échelle pour des comptes hebdomadaires

Cas reportés à la semaine  $w: \gamma > 1$ 

$$\begin{split} \frac{Z_w}{\gamma} \mid Z_1, \dots, Z_{w-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\Psi_w^Z R_w}{\gamma}\right), \\ \Psi_w^Z &= \sum_{\tau_w} \psi(v) Z_{w-v} \end{split}$$

 $\psi$  : fonction d'intervalle de série **hebdomadaire** 



 $\phi, \psi$  : distributions Gamma moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours  $au_{\Psi} = 4$  semaines


### Modèle de Poisson remis à l'échelle pour des comptes hebdomadaires

Cas reportés à la semaine  $w: \gamma > 1$ 


$$\frac{Z_w}{\gamma} \mid Z_1, \dots, Z_{w-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\Psi_w^Z R_w}{\gamma}\right),$$

$$\Psi_w^Z = \sum_{v=1}^{T_w} \psi(v) Z_{w-v}$$

 $\psi$  : fonction d'intervalle de série  ${\bf hebdomadaire}$ 



 $\phi, \psi$ : distributions Gamma moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours  $\tau_{\Psi} = 4$  semaines




### Modèle de Poisson remis à l'échelle pour des comptes hebdomadaires


Cas reportés à la semaine  $w: \gamma > 1$ 

### $\psi$ : fonction d'intervalle de série ${\bf hebdomadaire}$

$$\begin{split} \frac{Z_w}{\gamma} \mid Z_1, \dots, Z_{w-1} \sim \mathcal{P}\left(\frac{\psi_w^Z R_w}{\gamma}\right), \\ \psi_w^Z &= \sum_{i=1}^n \psi(v) Z_{w-v} \end{split}$$



 $\phi, \psi$ : distributions Gamma moyenne 6,6 jours, écart-type 3,5 jours  $au_{\Psi} = 4$  semaines



### Distributions à priori

Loi à priori du nombre de reproduction hebdomadaire :

$$\pi\big(\mathsf{R}_w|\mathsf{R}_{w-1},\,\mathsf{R}_{w-2},\,\lambda_\mathsf{R}\big) \propto \lambda_\mathsf{R}\,\mathrm{e}^{-\frac{\lambda_\mathsf{R}}{4}|\mathsf{R}_w-2\mathsf{R}_{w-1}+\mathsf{R}_{w-2}|}$$

 $\Longrightarrow$  loi de Laplace de paramètre  $\lambda_R$  sur la dérivée seconde de  $R_w$ 

(Abry et coll. 2022, GRETSI'22; Fort et coll. 2023, IEEE Trans. Signal Process.)

### Distributions à priori

Loi à priori du nombre de reproduction hebdomadaire :

$$\pi(R_w|R_{w-1}, R_{w-2}, \lambda_R) \propto \lambda_R e^{-\frac{\lambda_R}{4}|R_w-2R_{w-1}+R_{w-2}|}$$

 $\Longrightarrow$  loi de Laplace de paramètre  $\lambda_{\mathsf{R}}$  sur la dérivée seconde de  $\mathsf{R}_{w}$ 

(Abry et coll. 2022, GRETSI'22; Fort et coll. 2023, IEEE Trans. Signal Process.)

Loi a priori du paramètre de la loi de Laplace : Gamma, conjuguée à Laplace

$$\pi(\lambda_{\mathsf{R}}) \propto \lambda_{\mathsf{R}}^{\alpha_{\mathsf{R}}-1} \mathrm{e}^{-\beta_{\mathsf{R}}\lambda_{\mathsf{R}}}$$

d'espérance  $\mu_{\rm R}=\alpha_{\rm R}/\beta_{\rm R}$  et de variance  $\sigma_{\rm R}^2=\alpha_{\rm R}/\beta_{\rm R}^2$  (Abry et coll. 2025, *ICASSP*)

### Distributions à priori

Loi à priori du nombre de reproduction hebdomadaire :

$$\pi(R_w|R_{w-1}, R_{w-2}, \lambda_R) \propto \lambda_R e^{-\frac{\lambda_R}{4}|R_w - 2R_{w-1} + R_{w-2}|}$$

 $\Longrightarrow$  loi de Laplace de paramètre  $\lambda_{\mathsf{R}}$  sur la dérivée seconde de  $\mathsf{R}_{w}$ 

(Abry et coll. 2022, GRETSI'22; Fort et coll. 2023, IEEE Trans. Signal Process.)

Loi a priori du paramètre de la loi de Laplace : Gamma, conjuguée à Laplace

$$\pi(\lambda_{\rm R}) \propto \lambda_{\rm R}^{\alpha_{\rm R}-1} {\rm e}^{-\beta_{\rm R} \lambda_{\rm R}}$$

d'espérance  $\mu_{\rm R}=\alpha_{\rm R}/\beta_{\rm R}$  et de variance  $\sigma_{\rm R}^2=\alpha_{\rm R}/\beta_{\rm R}^2$  (Abry et coll. 2025, *ICASSP*)

 $\Longrightarrow \alpha_{\rm R} >$  0,  $\beta_{\rm R} >$  0 choisis pour que l'hyperprior soit quasi-non informatif  $\it via$ 

$$\mu_{R} = 3.5 \times \mathrm{std}(\mathbf{Z})/\gamma$$
 et  $\sigma_{R} = 20 \times \mu_{R}$ 

centré en valeur historique de  $\lambda_R$  (Abry et coll. 2020, *PLOS One*) et très **plat** 

**Distribution jointe à posteriori :** par la règle de Bayes  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_R | \mathbf{Z}, R_{-1}, R_0) =$ 

$$-\sum_{w=1}^{W}\frac{\left(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}}-\mathsf{Z}_{w}\ln(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}})\right)}{\gamma}-\lambda_{\mathsf{R}}\left(\|\mathsf{D}\boldsymbol{\mathsf{R}}+\boldsymbol{\delta}\|_{1}+\beta_{\mathsf{R}}\right)+\left(W+\alpha_{\mathsf{R}}-1\right)\ln\lambda_{\mathsf{R}}$$

- où  $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_W)$ : nombres de reproduction hebdomadaires
  - $\lambda_R$  : hyperparamètre de la loi à priori sur  ${\bf R}$
  - $\mathbf{Z} = (Z_1, \ldots, Z_W)$ : comptes d'infections hebdomadaires
  - $R_{-1}$ ,  $R_0$ : nombres de reproduction initiaux
  - $\gamma$  : paramètre d'échelle
  - $\alpha_R$ ,  $\beta_R$ : hyperparamètres

$$\forall w \in \left\{2, \, \dots, \, W\right\}, \; \left(\mathsf{DR}\right)_w := \left(\mathsf{R}_w - 2\mathsf{R}_{w-1} + \mathsf{R}_{w-2}\right)/4, \; \text{au bord } \left(\mathsf{DR}\right)_1 = \mathsf{R}_1/4, \\ \left(\mathsf{DR}\right)_2 = \mathsf{R}_2/4 - \mathsf{R}_1/2 \\ 4\delta = \left(\mathsf{R}_{-1} - 2\mathsf{R}_0, \quad \mathsf{R}_0, \quad 0, \quad \dots \quad 0\right)^\top \in \mathbb{R}^W$$

**Distribution jointe à posteriori :** par la règle de Bayes  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_{R} | \mathbf{Z}, R_{-1}, R_{0}) =$ 

$$-\sum_{-}^{W}\frac{\left(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\boldsymbol{\mathsf{Z}}}-\mathsf{Z}_{w}\ln(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\boldsymbol{\mathsf{Z}}})\right)}{\gamma}-\lambda_{\mathsf{R}}\left(\|\mathsf{D}\boldsymbol{\mathsf{R}}+\boldsymbol{\delta}\|_{1}+\beta_{\mathsf{R}}\right)+\left(W+\alpha_{\mathsf{R}}-1\right)\ln\lambda_{\mathsf{R}}$$

- où  $\mathbf{R} = (R_1, \, \dots, \, R_W)$ : nombres de reproduction hebdomadaires
  - $\lambda_R$ : hyperparamètre de la loi à priori sur **R**
  - $\mathbf{Z} = (\mathsf{Z}_1, \ldots, \mathsf{Z}_W)$ : comptes d'infections hebdomadaires
  - $R_{-1}$ ,  $R_0$ : nombres de reproduction initiaux
  - $\gamma$  : paramètre d'échelle
  - $\alpha_R$ ,  $\beta_R$ : hyperparamètres

$$\forall w \in \left\{2, \, \dots, \, W\right\}, \; \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_w := \left(\mathsf{R}_w - 2\mathsf{R}_{w-1} + \mathsf{R}_{w-2}\right)/4, \; \text{au bord } \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_1 = \mathsf{R}_1/4, \\ \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_2 = \mathsf{R}_2/4 - \mathsf{R}_1/2 \\ 4\delta = \left(\mathsf{R}_{-1} - 2\mathsf{R}_0, \quad \mathsf{R}_0, \quad 0, \quad \dots \quad 0\right)^\top \in \mathbb{R}^W$$

$$\pi(\boldsymbol{R}|\boldsymbol{Z},\,R_{-1},\,R_{0}) = \int_{\mathbb{R}^{W}} \pi(\boldsymbol{R}|\boldsymbol{Z},\,R_{-1},\,R_{0},\,\lambda_{R}) \pi_{\alpha_{R},\,\beta_{R}}(\lambda_{R}) \,\mathrm{d}\lambda_{R}$$

**Distribution jointe à posteriori :** par la règle de Bayes  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_{\mathbf{R}} | \mathbf{Z}, \mathbf{R}_{-1}, \mathbf{R}_{0}) =$ 

$$-\sum_{}^{W}\frac{\left(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\boldsymbol{\mathsf{Z}}}-\mathsf{Z}_{w}\ln(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\boldsymbol{\mathsf{Z}}})\right)}{\gamma}-\lambda_{\mathsf{R}}\left(\|\mathsf{D}\boldsymbol{\mathsf{R}}+\boldsymbol{\delta}\|_{1}+\beta_{\mathsf{R}}\right)+\left(W+\alpha_{\mathsf{R}}-1\right)\ln\lambda_{\mathsf{R}}$$

- où  $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_W)$ : nombres de reproduction hebdomadaires inconnus
  - $\lambda_{R}$  : hyperparamètre de la loi à priori sur **R** inconnus
  - $\mathbf{Z} = (Z_1, \ldots, Z_W)$ : comptes d'infections hebdomadaires
  - $R_{-1}$ ,  $R_0$ : nombres de reproduction initiaux
  - $\gamma$  : paramètre d'échelle
  - $\alpha_R$ ,  $\beta_R$ : hyperparamètres

$$\forall w \in \left\{2, \, \dots, \, W\right\}, \; \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_w := \left(\mathsf{R}_w - 2\mathsf{R}_{w-1} + \mathsf{R}_{w-2}\right)/4, \; \text{au bord } \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_1 = \mathsf{R}_1/4, \\ \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_2 = \mathsf{R}_2/4 - \mathsf{R}_1/2 \\ 4\delta = \left(\mathsf{R}_{-1} - 2\mathsf{R}_0, \quad \mathsf{R}_0, \quad 0, \quad \dots \quad 0\right)^\top \in \mathbb{R}^W$$

$$\pi(\mathbf{R}|\mathbf{Z},\,\mathsf{R}_{-1},\,\mathsf{R}_0) = \int_{\mathbb{R}^{W}_{\perp}} \pi(\mathbf{R}|\mathbf{Z},\,\mathsf{R}_{-1},\,\mathsf{R}_0,\,\lambda_\mathsf{R}) \pi_{\alpha_\mathsf{R},\,\beta_\mathsf{R}}(\lambda_\mathsf{R}) \,\mathrm{d}\lambda_\mathsf{R}$$

**Distribution jointe à posteriori :** par la règle de Bayes  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_{\mathbf{R}} | \mathbf{Z}, \mathbf{R}_{-1}, \mathbf{R}_{0}) =$ 

$$-\sum_{}^{W}\frac{\left(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}}-\mathsf{Z}_{w}\ln(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}})\right)}{\gamma}-\lambda_{\mathsf{R}}\left(\|\mathsf{D}\boldsymbol{\mathsf{R}}+\boldsymbol{\delta}\|_{1}+\beta_{\mathsf{R}}\right)+\left(W+\alpha_{\mathsf{R}}-1\right)\ln\lambda_{\mathsf{R}}$$

- où  $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_W)$ : nombres de reproduction hebdomadaires inconnus
  - $\lambda_{R}$  : hyperparamètre de la loi à priori sur **R** inconnus
  - $\mathbf{Z} = (Z_1, ..., Z_W)$ : comptes d'infections hebdomadaires mesurés
    - $R_{-1}$ ,  $R_0$ : nombres de reproduction initiaux
    - $\gamma$  : paramètre d'échelle
    - $\alpha_R, \beta_R$  : hyperparamètres

$$\forall w \in \left\{2, \, \dots, \, W\right\}, \; \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_w := \left(\mathsf{R}_w - 2\mathsf{R}_{w-1} + \mathsf{R}_{w-2}\right)/4, \; \text{au bord } \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_1 = \mathsf{R}_1/4, \\ \left(\mathsf{D}\mathbf{R}\right)_2 = \mathsf{R}_2/4 - \mathsf{R}_1/2 \\ 4\delta = \left(\mathsf{R}_{-1} - 2\mathsf{R}_0, \quad \mathsf{R}_0, \quad 0, \quad \dots \quad 0\right)^\top \in \mathbb{R}^W$$

$$\pi(\boldsymbol{R}|\boldsymbol{Z},\,R_{-1},\,R_{0}) = \int_{\mathbb{R}^{W}} \pi(\boldsymbol{R}|\boldsymbol{Z},\,R_{-1},\,R_{0},\,\lambda_{R}) \pi_{\alpha_{R},\,\beta_{R}}(\lambda_{R}) \,\mathrm{d}\lambda_{R}$$

**Distribution jointe à posteriori** : par la règle de Bayes  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_{\mathbf{R}} | \mathbf{Z}, \mathbf{R}_{-1}, \mathbf{R}_{0}) =$ 

$$-\sum_{k=1}^{W}\frac{\left(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\boldsymbol{\mathsf{Z}}}-\mathsf{Z}_{w}\ln(\mathsf{R}_{w}\boldsymbol{\Phi}_{w}^{\boldsymbol{\mathsf{Z}}})\right)}{\gamma}-\lambda_{\mathsf{R}}\left(\|\mathsf{D}\boldsymbol{\mathsf{R}}+\boldsymbol{\delta}\|_{1}+\beta_{\mathsf{R}}\right)+\left(W+\alpha_{\mathsf{R}}-1\right)\ln\lambda_{\mathsf{R}}$$

où •  $\mathbf{R} = (R_1, \, \dots, \, R_W)$  : nombres de reproduction hebdomadaires inconnus

•  $\lambda_{\mathsf{R}}$  : hyperparamètre de la loi à priori sur  $\mathsf{R}$  inconnus

•  $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_W)$ : comptes d'infections hebdomadaires mesurés

•  $R_{-1}, R_0$ : nombres de reproduction initiaux  $R_w = Z_w/\Phi_w^Z, w \in \{-1, 0\}$ 

ullet  $\gamma$  : paramètre d'échelle  $\gamma = 0.025 imes \mathrm{std}(\mathbf{Z})$ 

ullet  $lpha_{\mathsf{R}},eta_{\mathsf{R}}$  : hyperparamètres fixés pour être non informatifs

$$\begin{aligned} \forall w \in \left\{2, \, \dots, \, W\right\}, \; \left(\mathsf{D} R\right)_w &:= \left(\mathsf{R}_w - 2\mathsf{R}_{w-1} + \mathsf{R}_{w-2}\right)/4, \; \text{au bord } \left(\mathsf{D} R\right)_1 = \mathsf{R}_1/4, \\ & 4\delta = \left(\mathsf{R}_{-1} - 2\mathsf{R}_0, \quad \mathsf{R}_0, \quad 0, \quad \dots \quad 0\right)^\top \in \mathbb{R}^W \end{aligned}$$

$$\pi(\boldsymbol{\mathsf{R}}|\boldsymbol{\mathsf{Z}},\,\mathsf{R}_{-1},\,\mathsf{R}_{0}) = \int_{\mathbb{R}^{W}_{+}} \pi(\boldsymbol{\mathsf{R}}|\boldsymbol{\mathsf{Z}},\,\mathsf{R}_{-1},\,\mathsf{R}_{0},\,\lambda_{\mathsf{R}}) \pi_{\alpha_{\mathsf{R}},\,\beta_{\mathsf{R}}}(\lambda_{\mathsf{R}}) \,\mathrm{d}\lambda_{\mathsf{R}}$$

## Estimateurs bayésiens du nombre de reproduction hebdomadaire

Objectif : estimation de R<sub>w</sub> précise, robuste avec niveau de confiance fiable

### Estimateurs bayésiens du nombre de reproduction hebdomadaire

Objectif : estimation de R<sub>w</sub> précise, robuste avec niveau de confiance fiable

### Estimateurs bayésiens hiérarchiques du nombre de reproduction $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_W)$

- ullet moyenne à posteriori :  $\widehat{\pmb{R}}^{\mathsf{Hebdo}-\mathsf{Bayes}}$ 
  - sous lois jointe  $\pi(\mathbf{R},\,\lambda_{R}|\mathbf{Z},\,\mathsf{R}_{-1},\,\mathsf{R}_{0})$  et marginale  $\pi(\mathbf{R}|\mathbf{Z},\,\mathsf{R}_{-1},\,\mathsf{R}_{0})$
- intervalles de crédibilité à 95% :  $\widehat{IC}_{uv}^{Hebdo-Bayes}$

sous loi marginale  $\pi(R_w|\mathbf{Z}, R_{-1}, R_0)$ 

### Estimateurs bayésiens du nombre de reproduction hebdomadaire

Objectif : estimation de R<sub>w</sub> précise, robuste avec niveau de confiance fiable

Estimateurs bayésiens hiérarchiques du nombre de reproduction  $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_W)$ 

- moyenne à posteriori :  $\widehat{\mathbf{R}}^{\mathsf{Hebdo}-\mathsf{Bayes}}$ 
  - sous lois jointe  $\pi(\textbf{R},\,\lambda_{R}|\textbf{Z},\,R_{-1},\,R_{0})$  et marginale  $\pi(\textbf{R}|\textbf{Z},\,R_{-1},\,R_{0})$
- intervalles de crédibilité à 95% :  $\widehat{IC}_{...}^{Hebdo-Bayes}$

sous loi marginale  $\pi(R_w|\mathbf{Z}, R_{-1}, R_0)$ 

Ni loi jointe ni loi marginale connues sous forme explicite :

⇒ algorithme de Monte Carlo par chaîne de Markov

suite  $(\mathbf{R}^{(k)}, \lambda_{\mathbf{R}}^{(k)}; k \in \mathbb{N})$  converge en loi vers  $\pi(\mathbf{R}, \lambda_{\mathbf{R}} | \mathbf{Z}, \mathbf{R}_{-1}, \mathbf{R}_{0})$ 

puis moyennes, quantiles **empiriques** calculés sur  $(\mathbf{R}^{(k)}, \lambda_{\mathbf{R}}^{(k)}; \ k \geq k_{\mathsf{chauffe}})$ 

## Échantillonneur de Gibbs de la loi jointe à posteriori

Distribution jointe à posteriori  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_{\mathbf{R}} | \mathbf{Z}, \mathbf{R}_{-1}, \mathbf{R}_{0})$ 

$$= -\sum_{w=1}^{W} \frac{\left(\mathsf{R}_{w} \boldsymbol{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}} - \mathsf{Z}_{w} \ln(\mathsf{R}_{w} \boldsymbol{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}})\right)}{\gamma} - \lambda_{\mathsf{R}} \left(\|\mathsf{D}\mathsf{R} + \boldsymbol{\delta}\|_{1} + \beta_{\mathsf{R}}\right) + \left(W + \alpha_{\mathsf{R}} - 1\right) \ln \lambda_{\mathsf{R}}$$

non différentiable par rapport à R et opérateur linéaire D composé à la norme  $\ell_1$ 

## Échantillonneur de Gibbs de la loi jointe à posteriori

**Distribution jointe à posteriori**  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_{\mathbf{R}} | \mathbf{Z}, \mathbf{R}_{-1}, \mathbf{R}_{0})$ 

$$= -\sum_{w=1}^{W} \frac{\left(\mathsf{R}_w \boldsymbol{\Phi}_w^{\mathsf{Z}} - \mathsf{Z}_w \ln(\mathsf{R}_w \boldsymbol{\Phi}_w^{\mathsf{Z}})\right)}{\gamma} - \lambda_{\mathsf{R}} \left(\|\mathsf{D}\mathsf{R} + \delta\|_1 + \beta_{\mathsf{R}}\right) + \left(W + \alpha_{\mathsf{R}} - 1\right) \ln \lambda_{\mathsf{R}}$$

non différentiable par rapport à  ${f R}$  et opérateur linéaire  ${\sf D}$  composé à la norme  $\ell_1$ 

Gibbs avec Langevin proximal (Fort et coll. 2023, IEEE Trans. Signal Process.)

- échantillonnage de R : proposition de type gradient proximal préconditionné
  - (Pascal et coll. 2022, IEEE Trans. Signal Process.; Artigas et coll. 2022, EUSIPCO'22)
- échantillonnage de  $\lambda_{R}$  : exact car loi conjuguée

## Échantillonneur de Gibbs de la loi jointe à posteriori

Distribution jointe à posteriori  $\ln \pi(\mathbf{R}, \lambda_{R}|\mathbf{Z}, R_{-1}, R_{0})$ 

$$= -\sum_{w=1}^{W} \frac{\left(\mathsf{R}_{w} \mathsf{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}} - \mathsf{Z}_{w} \mathsf{\ln}(\mathsf{R}_{w} \mathsf{\Phi}_{w}^{\mathsf{Z}})\right)}{\gamma} - \lambda_{\mathsf{R}} \left(\|\mathsf{D} \mathsf{R} + \delta\|_{1} + \beta_{\mathsf{R}}\right) + \left(W + \alpha_{\mathsf{R}} - 1\right) \mathsf{\ln} \lambda_{\mathsf{R}}$$

non différentiable par rapport à  ${f R}$  et opérateur linéaire  ${f D}$  composé à la norme  $\ell_1$ 

Gibbs avec Langevin proximal (Fort et coll. 2023, IEEE Trans. Signal Process.)

- échantillonnage de R : proposition de type gradient proximal préconditionné
  - (Pascal et coll. 2022, IEEE Trans. Signal Process.; Artigas et coll. 2022, EUSIPCO'22)
  - échantillonnage de  $\lambda_{R}$  : exact car loi conjuguée

**Résultat**: 
$$\widehat{\mathbf{R}}^{\mathsf{Hebdo-Bayes}}$$
,  $\widehat{\mathsf{IC}}^{\mathsf{Hebdo-Bayes}}$   
**pour**  $k = 0...k_{\mathsf{max}}$  **faire**


**Entrées**: **Z**,  $\Phi^{\mathbf{Z}}$ ,  $\mathsf{R}_{-1}$ ,  $\mathsf{R}_{0}$ ,  $\alpha_{\mathsf{R}}$ ,  $\beta_{\mathsf{R}}$ ,  $\varepsilon$ ; initialisation:  $\mathbf{R}^{(0)} \in \mathbb{R}^{W}_{>0}$ ,  $\lambda_{\mathsf{R}}^{(0)} \in \mathbb{R}_{>0}$ 

fin  $\widehat{\mathbf{R}}$  ← Moyenne{ $\mathbf{R}^{(k)}$ ,  $k \ge k_{\text{chauffe}}$ };  $\widehat{\mathbf{IC}}$  ← Quantiles<sub> $\varepsilon,1-\varepsilon$ </sub>{ $\mathbf{R}^{(k)}$ ,  $k \ge k_{\text{chauffe}}$ };

<u>10/</u>18

### Convergence de l'échantillonneur de Gibbs


 $\langle \cdot \rangle$  : moyenne sur dix chaînes indépendantes de  $5 \cdot 10^7$  itérations dont chauffe de  $3 \cdot 10^7$ 




Pour les trois initialisations de la chaîne de Markov :

- la valeur de la log-distribution se stabilise;
- de même que l'amplitude de ses fluctuations ;
- indépendamment de l'initialisation.


## Suivi de la COVID-19 aux États-Unis : données agrégées




## Suivi de la COVID-19 en France : données agrégées




## Suivi de la COVID-19 en Allemagne : données agrégées



## Suivi de la COVID-19 en Israël : données agrégées



## Suivi de la COVID-19 au Royaume-Uni : report hebdomadaire




#### Performances comparées de l'estimateur Hebdo — Bayes


- en accord global avec EpiEstim sur la valeur du nombre de reproduction
- Hebdo Bayes comportement plus régulier en temps et sans artefacts
- estimée plus lisible et détection passage au-dessus de un plus précise
- intervalle de crédibilité Hebdo Bayes de taille plus **réaliste** et variable

⇒ mesure précisément R et estimation incertitude fiable à la fois sur

# données agrégées



### comptes hebdomadaires



#### Contributions principales:

- modèle bayésien hiérarchique de la propagation d'une épidémie virale
- adapté à un report de cas et donc un nombre de reproduction hebdomadaires
- reflétant les fluctuations intrinsèques des comptes via un paramètre d'échelle
- échantillonné par Monte Carlo par chaîne de Markov : schéma de Gibbs efficace

⇒ application données réelles différents pays/phases de la pandémie de COVID-19

#### Contributions principales:

- modèle bayésien hiérarchique de la propagation d'une épidémie virale
- adapté à un report de cas et donc un nombre de reproduction hebdomadaires
- reflétant les fluctuations intrinsèques des comptes via un paramètre d'échelle
- échantillonné par Monte Carlo par chaîne de Markov : schéma de Gibbs efficace
- ⇒ application données réelles différents pays/phases de la pandémie de COVID-19

#### Travaux en cours et perspectives :

- modèle remis à l'échelle quotidien avec prise en compte des erreurs de report
- ullet échantillonnage joint ou estimation des **paramètres** du modèle paramètre d'échelle  $\gamma$ , moyenne et écart-type de la fonction d'intervalle de série  $\phi$

#### Contributions principales :

- modèle bayésien hiérarchique de la propagation d'une épidémie virale
- adapté à un report de cas et donc un nombre de reproduction hebdomadaires
- reflétant les fluctuations intrinsèques des comptes via un paramètre d'échelle
- échantillonné par Monte Carlo par chaîne de Markov : schéma de Gibbs efficace
- ⇒ application données réelles différents pays/phases de la pandémie de COVID-19

#### Travaux en cours et perspectives :

- modèle remis à l'échelle quotidien avec prise en compte des erreurs de report
- ullet échantillonnage joint ou estimation des **paramètres** du modèle paramètre d'échelle  $\gamma$ , moyenne et écart-type de la fonction d'intervalle de série  $\phi$



hal.science/hal-05013785

